

Choroby grzybowe

I termin:

opryskiwanie od połowy kwietnia do początku maja:

- Aronia, berberysy, bluszcz, brzozy, bukszpan, irgi, jaśminowce, forsycje, głogi, kaliny, kasztanowiec, klony, ligustr, lilak, migdałowiec, olsza, orzech włoski, pigwowiec, porzeczki, robinia, tamaryszek, trzmielina, wiciokrzewy, wierzby, złotokap, żyliski
 - Dithane M-45 WP (0,2%) lub Penncozeb 80 WP (0,2%)
 - Dithane75WG (0,2%) lub Penncozeb 75 WG (0,2%)
 - Dithane 455 SC (0,35%) lub Penncozeb 455 SC (0,35%)
- Barwinek
 - podlewanie Sandofan Manco 64 WP (0,2%)

II termin:

opryskiwanie od połowy maja do początku czerwca:

- Cisy, cyprysiki, jałowce, jodły, sosny, świerki, żywotniki, brzozy, irgi, kasztanowiec, katalpa, lipy, różanecznik, śnieguliczka, tamaryszek, złotokap
 - Rovral Flo 255 SC (0,2%) lub Rovral 50 WP (0,1%) z dodatkiem Topsin M 70 WP (0,1%) lub Sarfun 500 SC (0,1%)
- Berberysy, dęby, karagana, klony, pieciornik, róże, trzmielina
 - Nimrod 25 EC (0,2%) lub Afugan 30 EC (0,05%)
- Wierzby
 - Baycor 300 EC (0,2%) lub Saprol (0,15%) lub Amistar 250 SC (0,1%)
- Barwinek
 - podlewanie Sandofan Manco 64 WP (0,2%)

III termin:

opryskiwanie od połowy czerwca do początku lipca:

- Cisy, cyprysiki, jałowce, jodły, sosny, świerki, żywotniki, brzozy, bukszpan, irgi, kasztanowiec, katalpa, lipy, wiciokrzewy, złotokap
 - Bravo 500 SC (0,2%) lub Gwarant 550 SC (0,2%) + Topsin M 70 WP (0,1%) lub Sarfun 500 SC (0,1%)
- Berberysy, dęby, karagana, klony, pieciornik, róże, tawuły, trzmielina
 - Nimrod 25 EC (0,2%) lub Afugan 30 EC (0,05%)
- Wierzby
 - Baycor 300 EC (0,2%) lub Saprol (0,15%) lub Amistar 250 SC (0,1%)
- Barwinek
 - podlewanie Sandofan Manco 64 WP (0,2%)

IV termin:

opryskiwanie od połowy lipca do początku sierpnia:

- Wszystkie krzewy i drzewa, a koniecznie, cisy, cyprysiki, jałowce, jodły, sosny, świerki, żywotniki, brzozy, irgi, głąg, kasztanowiec, mahonia, róże, tamaryszek, wierzby
 - Score 250 EC (0,05%)

V termin:

opryskiwanie od połowy sierpnia do początku września:

- Wszystkie krzewy i drzewa, a koniecznie, cisy, cyprysiki, jałowce, jodły, sosny, świerki, żywotnik zachodni, brzozy, irgi
 - Sportak Alpha 380 EC (0,05%) lub Sportak 45 EC (0,05%) albo Mirage 45 EC (0,05%) z dodatkiem Topsin M 70 WP (0,1%) lub Sarfun 500 SC (0,1%)

Szkodniki

I termin:

od listopada do marca przy temp. powyżej 12 °C:

- misecznik cisowiec : cisy
misecznik tujowiec: żywotniki
ochojnik świerkowo-modrzewiowy i inne mszyce: świerki
ochojnik sosnowy: sosny
zdobniczka bukowa: buk
 - Promanal 60 AL (2%) , Paroil (2%) lub preparatem pyretroidowym np. Fastac 10 EC (0,02%)

II termin:

od końca kwietnia do połowy maja, w okresie pękania pąków i rozwijania się liści przy temp. powyżej 18°:

- szpeciecie: azalie, berberysy, bukszpan, grab, jałowce, jesiony, kaliny, klony, ligustr, migdałowiec, olsza, robinia, tawuły
 - dwukrotnie co 14 dni: Mitac 200 EC (0,2%) i Marshal 250 EC (0,15%)
- przędziorek sosnowiec: świerki, cyprysiki, żywotniki
przędziorek chmielowiec: forsycja, hortensja, klony, tawuły, trzmieliny, pięciornik, żylistek, wiciokrzewy
przędziorek wierzbowiec: wierzby
 - dwukrotnie co 10 dni: Apollo 500 SC (0,1%) i Nissorun 050 EC (0,06%) z dodatkiem: Danitol 10 EC (0,05%) lub Talstar 100 EC (0,05%)

III termin:

koniec maja-początek czerwca tj. okres kwitnienia głogów lub 2 tygodnie po kwitnieniu jabłoni:

- wciornastki: jesiony, ligustr, hlaki
skorupik jabłoniowy: bukszpan, irgi, jabłonie
 - dwukrotnie co 10 dni: Marshal 250 EC (0,15%) + Mospilan 20 SP (0,02%)

IV termin:

po połowie czerwca:

- tarcznikjałowcowiec: jałowce
 - Actellic 500 EC (0,1%) + Mospilan 20 SP (0,02%) lub Confidor 200 SL (0,125%)

V termin:

na początku lipca:

- tarcznik jałowcowiec: jałowce

misecznik cisowiec: cisy

- Actellic 500 EC (0,1%) + Mospilan 20 SP (0,02%)

VI termin:

po połowie lipca:

- tarcznik jałowcowiec: jałowce
misecznik cisowiec: cisy
misecznik tujowiec: żywotniki
 - Actellic 500 EC (0,1%) + Mospilan 20 SP (0,02%) lub Confidor 200 SL (0,125%)

VII termin:

po połowie sierpnia:

- misecznik tujowiec: żywotniki
 - Actellic 500 EC (0,1%) + Mospilan 20 SP (0,02%) lub Confidor 200 SL (0,125%)
- Po wykryciu pierwszych kolonii mszyc: berberys, brzoza, głogi, jabłonie, karagana, klony, ligustr, robinia, tawuły, trzmielina, żylitek, wierzby
 - Mospilan 20 SP (0,02%)
 - Aztec 140 EW (0,08%)
 - Confidor 200 SL (0,04%)
 - Confidor 200 SL (0,125%)

Rośliny wrzosowate

I termin:

koniec kwietnia-początek maja:

- Opryskiwanie: Kaptan zaw. 50 WP (0,2%)

II termin:

koniec maja-początek czerwca:

- Opryskiwanie: Aliette 80 WP (0,2%)

III termin:

koniec czerwca-początek lipca:

- Opryskiwanie: Aliette 80 WP (0,2%)

IV termin:

połowa lipca:

- Podlewanie: Fongarid 25 WP (0,05%)

V termin:

koniec lipca-początek sierpnia

- Opryskiwanie: Aliette 80 WP (0,2%)